

## LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

# LE TACAUD



### CARACTERISTIQUES :

**Famille :** Gadidés

(Morue, Merlan, capelan, lieu, aiglefin, lingue, ....)

**Synonymes en Manche :** gode, pelouse, poule de mer.

**Distribution :** Mer du Nord, Manche, îles Britanniques, bande côtière pour la façade Atlantique, Afrique du nord, Ouest Méditerranée.

**Habitat :** vit en bancs souvent associés aux Capelans sur fonds sableux, rocheux et les ports (5 à 200m). Les sujets adultes priseront particulièrement les épaves. C'est le poisson le plus commun que nous rencontrerons. **(Bancs très denses souvent observés sur l'Oijfeld)**

**Nourriture :** petits crustacés, vers , petits poissons, Mollusques, échinodermes. **Taille commune :** 15 à 35 cm. (Maxi 46 cm. et 2,5Kg )

**Longévité :** 3 à 4 ans Maxi en Manche. ( encore moins au Sud de l'Europe )


**Importance économique :** Pêché au chalut. => faible importance économique. Sert majoritairement à la fabrication de farine. Pour les pêcheurs à la ligne, il n'y a pas de taille de capture. Il est conseillé de les mettre au frais dès la capture. En effet, la chair fine de ce poisson se conserve mal mais les filets de tacauds reste un mets prisé des gourmets.



**CROISSANCE et REPRODUCTION :** Les tacauds ont une croissance très rapide et une vie très courte. Ils mesureront 20 cm pour les femelles et 16,5 cm pour les mâles dès la fin de leur première année ou ils atteindront leur maturité sexuelle. A partir de ce moment, la croissance ralentie. Ils fraient à faible profondeur. La période de ponte va de mi-janvier à fin avril. La femelle peut pondre jusqu'à 400 000 œufs mesurant 1mm. Ceux-ci sont pélagiques, donc ils dérivent entre deux eaux au dessus du plateau continental. Au bout d'une douzaine de jours, la larve de 3mm. éclot. Elle se métamorphose rapidement en se pigmentant, développant ses organes et ses formes. A 18mm, le jeune tacaud gagne les profondeurs à fonds sableux en quête de petits Organismes (il n'hésitera pas à remonter vers les ports et les estuaires ou il trouve une nourriture abondante).

**DESCRIPTION :**

Couvert de très petites écailles, le tacaud a 4 à 5 bandes verticales brunes cuivrées sur le dos (couleur plus ou moins accentuées selon les individus et le milieu). Sa ligne latérale est arquée au dessus de l'abdomen. Le ventre est blanc et il a une tache noire à la base de la nageoire pectorale. Il possède 3 nageoires dorsales et 2 anales. Ses 2 nageoires ventrales sont étroites et longues et il a un barbillon sous le menton qui lui sert d'organe sensoriel dans sa quête de nourriture.



*Dominique Resse*




*D. Boutigny*



*François Mathieu*

**DIFFERENCES ENTRE LE TACAUD ET LE CAPELAN :**



**TACAUD**

- Flanc rayés
- 1<sup>er</sup> nageoire anale arrondie
- Corps un peu plus haut
- Nageoires ventrales plus longues
- **Point noir à la base de la pectorale**
- Ligne latérale arquée

**CAPELAN**

- Flanc blanc argenté
- Corps légèrement plus allongé
- **Absence de point noir à la base de la pectorale**
- Atteint 23 cm. Maxi

